

## **PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADANIA RTG**

**RTG odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa, jamy brzusznej, urografii, cystografii, wlew doodbytniczy wymaga przygotowania:**

- badanie przy pomocy promieniowania jonizującego obrazuje odpowiednio kręgosłup lędźwiowo- krzyżowy w 2 projekcjach AP i bocznej, narządy jamy brzusznej, w wypadku urografii i cystografii układ moczowy, w wypadku wlewu jelito grube,
- uzyskanie dokładnego obrazu należy poprzedzić usunięciem z przewodu pokarmowego mas kałowych i gazów. Odpowiednie przygotowanie gwarantuje wysoką jakość obrazu radiologicznego, co umożliwi dokładniejszą diagnozę radiologiczną,
- w dniu poprzedzającym badanie należy spożywać jedynie pokarmy płynne i nie zawierające błonnika tzn. unikać świeżych warzyw i owoców, otrębów, kaszy, pieczywa. Pić płyny obojętne: wodę, niesłodzona herbatę. Nie pić kawy, nie palić, nie rzuć gumy. Osoby dorosłe powinny zażyć środek przeczyszczający np. Bisakodyl, Xenna oraz Espumisan 3 x 2 kapsułki.

## **PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADANIA RTG**

**RTG odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa, jamy brzusznej, urografii, cystografii, wlew doodbytniczy wymaga przygotowania:**

- badanie przy pomocy promieniowania jonizującego obrazuje odpowiednio kręgosłup lędźwiowo- krzyżowy w 2 projekcjach AP i bocznej, narządy jamy brzusznej, w wypadku urografii i cystografii układ moczowy, w wypadku wlewu jelito grube,
- uzyskanie dokładnego obrazu należy poprzedzić usunięciem z przewodu pokarmowego mas kałowych i gazów. Odpowiednie przygotowanie gwarantuje wysoką jakość obrazu radiologicznego, co umożliwi dokładniejszą diagnozę radiologiczną,
- w dniu poprzedzającym badanie należy spożywać jedynie pokarmy płynne i nie zawierające błonnika tzn. unikać świeżych warzyw i owoców, otrębów, kaszy, pieczywa. Pić płyny obojętne: wodę, niesłodzona herbatę. Nie pić kawy, nie palić, nie rzuć gumy. Osoby dorosłe powinny zażyć środek przeczyszczający np. Bisakodyl, Xenna oraz Espumisan 3 x 2 kapsułki.